

引用文献

- American Psychiatric Association.(2013). DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS FIFTH EDITION DSM-5. American Psychiatric Publishing, 596-602
- 天野まゆ, 大森理江, 渡邊千穂 他.(2012). 開胸・開腹手術を受けた高齢者に対する術前・術後リアリティオリエンテーションの術後せん妄予防への影響. 日本看護学会論文集: 老年看護, 42, 65-68
- Arend, E. & Christensen M. (2009). Delirium in the intensive care unit: a review. *Nursing in Critical Care*, 14(3), 145-154
- Baldwin, R., Pratt, H., Goring, H. et al. (2004). Does a nurse-led mental health liaison service for older people reduce psychiatric morbidity in acute general medical wards? A randomized controlled trial. *Age Ageing*, 33(5),472-478
- Barr, J., Fraser, G. L., Puntillo, K. et al. (2013). Clinical Practice Guidelines for the Management of Pain, Agitation, and Delirium in Adult Patients in the Intensive Care Unit. *Critical Care Medicine*, 41(1), 263-306
- Belanger, L. & Ducharme F. (2011). Patients' and Nurses' experiences of delirium: a review of qualitative studies. *Nursing in critical care*, 16(6), 303-315
- Bergeron, N., Dubois, M. J., Dumont, M. et al. (2001). Intensive Care Delirium Screening Checklist: evaluation of a new screening tool. *Intensive care medicine*, 27(5), 859-864
- Cole, M. G., McCusker, J., Bellavance, F. et al.(2002). Systematic detection and multidisciplinary care of delirium in older medical inpatients: A randomized trial. *Canadian Medical Association Journal*, 167(7), 753-759
- Culp, K., Mentes, J. & Wakefield, B. (2003). Hydration and acute confusion in long-term care residents. *Western Journal of Nursing Research*, 25(3), 251-66
- Ely, E. W., Inouye S. K., Bernard G.R., et al. (2001). Delirium in mechanically ventilated patients: Validity and reliability of the confusion assessment method for the intensive care unit(CAM-ICU). *JAMA*, 286, 2703-2710

- Ely, E. W., Shintani, A., Truman, B., et al. (2004). Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit. *JAMA*, 291(14), 1753-1762
- Fan, Y., Guo, Y., Li, Q. et al. (2012). A Review: Nursing of Intensive Care Unit Delirium. *Journal of Neuroscience Nursing*, 44(6), 307-316
- 原澤由香, 坂東ちあき, 中西佳代 他.(2008). 開心・開胸患者におけるせん妄予防への取り組み せん妄予防に向けた温罨法の効果. *函館五稜郭病院医誌*, 16, 43-46
- 長谷川真澄, 亀井智子. (2006). 急性期高齢患者のせん妄発生の予測に関する看護師のアセスメント構造. *聖路加看護学会誌*, 10(1), 1-10
- Hempenius, L., Slaets, J. P., van Asselt, D. et al. (2013). Outcomes of a geriatric liaison intervention to prevent the development of postoperative delirium in frail elderly cancer patients: Report on a multicentre, randomized, controlled trial. Retrieved May 2, 2014, from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3686791/>
- Inouye, S. K., Bogardus, S. T. J., Charpentier, P. A. et al. (1999). A MULTICOMPONENT INTERVENTION TO PREVENT DELIRIUM IN HOSPITALIZED OLDER PATIENTS. *The New England Journal of Medicine*, 340(9), 669-676
- Inouye, S. K., Foreman, M. D., Milon, L. C. et al. (2001). Nurses' Recognition of Delirium and Its Symptoms. *Aech Intern Medicine*, 161, 2467-2473
- Inouye, S. K., Bogardus, S. T., Jr, Williams, C. S. et al. (2003). The role of adherence on the effectiveness of nonpharmacologic interventions: Evidence from the delirium prevention trial. *Archives of Internal Medicine*, 163(8), 958-964.
- 石光英美子, 鎌倉やよい, 深田順子.(2006). 術後せん妄前駆症状観察ツール開発に関する基礎的研究—術後せん妄症状の構造化. *日本看護科学会誌*, 26(4), 74-83
- 菊池和則. (1999). 多職種チームの3つのモデル—チーム研究の為の基本的概念整理—. *社会福祉学*, 39(2), 273-290
- 古賀雄二, 若松弘也. (2012). ICU せん妄の評価と対策 : ABCDE バンドルと医源性リスク管理. *ICU と CCU*, 36(3), 167-179

厚生労働省 HP. (2012). 平成 24 年度診療報酬改定の概要

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryohoken/iryohoken15/dl/h24_01-03.pdf

[2014-05-10]

Leslie, D. L., Zhang, Y., Bogardus, S. T et al. (2005). Consequences of preventing delirium in hospitalized older adults on nursing home costs. *Journal of the American Geriatrics Society*, 53(3), 405-409

Lipowski, Z.J. (1987). Delirium (Acute Confusional States). *JAMA*, 258(13), 1789-1792

Lundstrom, M., Edlund, A., Karlsson, S. et al. (2005). A multifactorial intervention program reduces the duration of delirium, length of hospitalization, and mortality in delirious patients. *Journal of the American Geriatrics Society*, 53(4), 622-628.

Marcantonio, E. R., Flacker, J. M., Wright, R.J. et al. (2001). Reducing delirium after hip fracture: a randomized trial. *Journal of the American Geriatrics Society*, 49(5), 516-522

Marshall, M. C. & Soucy, M. D. (2003). Delirium in the Intensive Care Unit. *Critical Care Nursing*, 26(3), 172-178

Meager, D., Moran, M., Raju, B. et al. (2008). A new data-based motor subtype schema for delirium. *The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences*, 20(2), 185-193

Millsen, K., Foreman, M. D., Abraham, I.L. et al. (2001). A nurse-led interdisciplinary intervention program for delirium in elderly hip-fracture patients. *Journal of the American Geriatrics Society*, 49(5), 523-532

Morandi, A. & Jackson, J.C. (2011). Delirium in the Intensive Care Unit: A Review. *Neurologic the clinics*, 29, 749-763

Naughton, B. J., Saltzman, S., Ramadan, F. et al. (2005). A multifactorial intervention to reduce prevalence of delirium and shorten hospital length of stay. *Journal of the American Geriatrics Society*, 53(1), 18-23.

Neufeld, K. J., Leoutsakos, J. M. S., Sieber, F. E. et al. (2013). Outcomes of Early Delirium Diagnosis After General Anesthesia in the Elderly. *Anesthesia&Analgesia*, 117(2), 471-478

- Niam, D. M. W. T., Bruce, J. J. & Bruce, D. G.(2005). Quality project to prevent delirium after hip fracture. *Australasian Journal on Ageing*, 24(3), 174-177
- 日本麻酔科学会・周術期管理チームプロジェクト編. (2011). 周術期管理チームテキスト 第2版. 日本麻酔科学会, 4-8
- 日本集中治療医学会 J-PAD ガイドライン作成委員会.(2014). 日本版・集中治療室における成人重症患者に対する痛み・不穏・せん妄管理のための臨床ガイドライン. *日本集中治療医学会誌*, 21, 539-579
- 新村出編. (2008). 広辞苑 第六版. 岩波書店
- 西川雪乃.(2013). せん妄は防げる HELP プログラムの理論と実践 HELP プログラムの日本への導入報告 準備と現在の状況、これから HELP コーディネーターの立場から. *日本老年医学会雑誌*, 50(5), 647-650
- 岡下美香, 寺尾麻貴.(2013). 一般病棟で行うせん妄対策 せん妄対策システムの立ち上げのプロセス. *達人ナース*, 34(1), 60-64
- 落合甲太(2013). せん妄は防げる HELP プログラムの理論と実践 HELP プログラムの日本への導入報告 準備と現在の状況、これから 医師の立場から. *日本老年医学会雑誌*, 50(5), 644-646
- Pandharipande, P. P., Girard, T. D., Jackson, J. C. et al. (2013). Long-term cognitive impairment after critical illness. *The New England journal of medicine*, 369(14),1306-1316
- Robinson, T. N., Rasburn,C. D., Tran, Z.V. et al. (2009). Postoperative delirium in the elderly: risk factors and outcomes. *Annals of surgery*, 249(1), 173-178.
- Rogers, E. M. (2003). イノベーションの普及. 三浦利雄訳 (2007). 翔泳社.
- 佐々木杏子.(2014). 看護技術のイノベーションの普及ー日本における褥瘡ケアの普及過程からー. *日本看護技術学会誌*, 12(3),4-13
- 佐々木吉子, 林みよ子, 江川幸二ら. (2014). 術後せん妄ケアガイドライン作成に向けてーICU および外科病棟の入院患者における術後せん妄の発症状況および看護ケアの実態ー. *日本クリティカルケア看護学会誌*, 10(1), 51-62
- 佐藤真由美, 杉若裕子, 藤本真記子ら.(2003). 看護技術におけるイノベーションの普及に関する研究(第2報)ー普及に関する要因の分析ー. *青森保健大学雑誌*, 5(1). 85-94

- Siddiqi, N., Holt, R., Britton, A. M. et al. (2009). Interventions for preventing delirium in hospitalized patients. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Retrieved May 2, 2014, from <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005563.pub2/abstract>
- Strijbos, M. J., Steunenbergh, B., van der Mast, R. C. et al. (2013). Design and methods of the hospital elder life program (HELP), a multicomponent targeted intervention to prevent delirium in hospitalized older patients: Efficacy and cost-effectiveness in dutch health care. Retrieved May 2, 2014, from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3724594/>
- Tabet, N., Hudson, S., Sweeney, V. et al. (2005). An educational intervention can prevent delirium on acute medical wards. *Age and Ageing*, 34(2), 152-156
- 瀧口章子, 笹本喜美江, 薦田しず江 他.(2007). 【急性期病院におけるせん妄ケアの改善とシステム化】 大学病院におけるせん妄ケア改善のプロセス 研究会での事例検討から現場へ. *看護管理*, 17(7), 574-580
- Tokita, K., Tanaka, H., Kawamoto, M. et al. (2001). Patient-controlled epidural analgesia with bupivacaine and fentanyl suppresses postoperative delirium following hepatectomy. *Masui, the Japanese Journal of Anesthesiology*, 50(7), 742-746.
- Vasilevskis, E.E., Ely, E.W., Speroff, T. et al. (2010). Reducing Iatrogenic Risks ICU-Acquired Delirium and Weakness-Crossing the Quality Chasm. *CHEST*, 135(5), 1224-1233
- Wand, A.P.F., Thoo, W., Sciuriaga, H. et al. (2014). A multifaced educational intervention to prevent delirium in older inpatients: A before and after study. *International Journal of Nursing Studies*, 51, 974-982
- 山本留里, 山下明日香, 松本なほみ 他.(2012). 高齢下肢骨折患者の術後せん妄予防 アロマセラピーで概日リズムを整える. *日本看護学会論文集: 看護総合*, 42, 192-195
- 吉田千文, 酒井郁子, 綿貫成明(2007). 保健医療施設におけるせん妄ケアと看護師の体験する困難 せん妄対策システム整備状況との関連. *日本看護学会論文集: 看護管理*, 37, 187-189

Zaubler, T. S., Murphy, K., Rizzuto, L. et al. (2013). Quality improvement and cost savings with multicomponent delirium interventions: Replication of the hospital elder life program in a community hospital. *Psychosomatics*, 54(3), 219-226