

引用文献

- Aasheim,V., Nilsen,A.B.V., Lukasse,M.,& Reinar,L.M.(2011). Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma. *Cochrane Database of Systematic Reviews 2011*, 12. doi: 10.1002/14651858.CD006672.pub2.
- 阿部真也,小原拓, 佐藤倫広, 山口浩, 吉町昌子, 村井ユリ子, 後藤輝明.(2015). ドラッグストア併設型薬局薬剤師における周産期の葉酸摂取の重要性に関する認識. 医薬品相互作用研究,38(3),150-155.
- Alba,D., Nicky,C.,& Donna,C.(1998). Implementing evidence-based nursing: some misconceptions.*Evidence-Based Nursing*,1(2),38-40.
- 浅野二未也, 小原拓, 佐藤倫広, 大原宏司, 山口浩明, 早坂 正孝,... 村井ユリ子.(2016).出生児の神経管閉鎖障害リスク低下を目的とした葉酸摂取に関する地域の薬剤師の認識と推奨の割合と要因,医薬品相互作用研究,40(1-2),14-20.
- 麻生珠里, 北川真理子.(2014). 誘発分娩の受け止め方や認識が出産体験をした女性の心理に与える影響,日本助産学会誌,27(3),200.
- Baba,K.,Kataoka,Y.,Nakayama,K.,Yaju,Y.,Horiuchi,S.,&Eto.H.(2016). A cross-sectional survey of policies guiding second stage labor in urban Japanese hospitals, clinics and midwifery birth centers. *BMC Pregnancy and Childbirth*,16(1).
- Beckmann,M.M.,&Stock,M.O.(2013). Antenatal perineal massage for reducing perineal trauma. *Cochrane Database of Systematic Reviews 2013*, 4. doi: 10.1002/14651858.CD005123.pub3
- Begley,C.M.,Gyte,G.M.,Devane,D.,McGuire,W.,&Weeks,A.(2015). Active versus expectant management for women in the third stage of labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews 2015*, 3. doi: 10.1002/14651858.CD007412.pub4
- Blix,E.,Reinar,L.M.,Klovning,A.,& Øian.P.(2005). Prognostic value of the labour admission test and its effectiveness compared with auscultation only: a systematic review.*BJOG:an International Journal of Obstetrics and Gynaecology*,112,1595-1604.

Canadian Centre on Substance Abuse.(2013).Canada`s Low-Risk Alcohol Drinking Guidelines.

<http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/2012-Canada-Low-Risk-Alcohol-Drinking-Guidelines-Brochure-en.pdf>

Dahlen,H.G., Homer,C.S.E., Cooke,M., Upton,A.M., Nunn,R., &Brodrick,B.(2007).

Perineal Outcomes and Maternal Comfort Related to the Application of Perineal Warm Packs in the Second Stage of Labor: A Randomized Controlled Trial.*Birth*,(34),282-290.

Elharmeel,S.M., Chaudhary,Y., Tan,S., Scheermeyer,E., Hanafy,A., & Driel,M.L.(2011).

Surgical repair of spontaneous perineal tears that occur during childbirth versus no intervention. *Cochrane Database of Systematic Reviews 2011*, 8. doi: 10.1002/14651858.CD008534.pub2

Food Standards Agency.(2008). Food Standards Agency publishes new caffeine advice for pregnant women.

<http://tna.europarchive.org/20111116080332/http://www.food.gov.uk/news/pressreleases/2008/nov/caffeineadvice>

Gepshtein,Y.,Horiuchi,S.,&Eto,H.(2007). Independent Japanese midwives: A qualitative study of their practice and beliefs.*Japan Journal of Nursing Science*,4(2),85-93.

Groutz,A., Hasson,J., Wengier,A., Gold,R., Skornick-Rapaport,A., Lessing,J.B., &Gordon,D.,(2011). Third- and fourth-degree perineal tears: prevalence and risk factors in the third millennium. *American Journal of Obstetrics & Gynecology*,204(4),347.e1-347.e4.

Gupta,J.K.,Hofmeyr,G.J., & Shehmear,M. (2012). Position in the second stage of labour for women without epidural anaesthesia. *Cochrane Database of Systematic Reviews 2012*, 5. doi: 10.1002/14651858.CD002006.pub3

原梓,小原拓,目時弘仁,大久保孝義,川口麻衣子,佐藤友里恵,... 今井 潤.(2011). 妊娠前後における女性のサプリメント摂取 BOSHI 研究.医薬品相互作用研究,(1),11-16

橋本圭司.(2013,1月).子どもの発達を支える親子のコミュニケーション.エコチル調査2周年記念シンポジウム,東京都.

<https://www.env.go.jp/chemi/ceh/action/data/130123part2.pdf>

細野茂春(監修).(2016).1 章 新生児蘇生法とは-NCPR ガイドライン作成と改正点.日本版救急蘇生ガイドライン 2015 に基づく NCPR 新生児蘇生法テキスト第 3 版(pp.33).メジカルビュー社.

一般社団法人 日本助産学会.(2012).エビデンスに基づく助産ガイドライン-分娩期 2012.

http://square.umin.ac.jp/jam/docs/ebm_guideline_childbirth2012.pdf

一般社団法人 日本周産期・新生児医学会.(2016).新生児蘇生法普及事業 講習会開催実績グラフで見る過去推移 有効認定者数(累計、認定区分別).

<http://www.ncpr.jp/pdf/201612/201612-5.pdf>

一般財団法人 日本救急医療財団.(2011).JRC(日本版)ガイドライン 2010(ドラフト版)のダウンロード 新生児の蘇生(NCPR) 第 4 章 新生児の蘇生(NCPR).

http://www.qqzaidan.jp/pdf_5/guideline4_NEO.pdf

石井薫,前田眞,海野信也.(2013). わが国の高次周産期医療機関におけるクリステレル胎児圧出法—子宮底圧迫法の実施状況.日本周産期・新生児医学会雑誌.49(3),1121-1125.

岩谷澄香,赤井由紀子,内山和美,鍵谷英明,山川正信.(2006).わが国の産科を有する病院における“Care in normal birth : a practical guide”の実践状況と改善点.母性衛生,46(4),666-673.

岩谷澄香,内山和美,炭原加代,大西玲子,山川正信.(2016).わが国の病院における Care in normal birth : a practical guide (WHO) 実践状況の 10 年間の変化と改善点.母性衛生,57(2),288-295.

Kataoka,Y.,Nakayama,Y.,Yaju,K.,Eto,Y.,&Horiuchi,S.(2015). Comparison of policies for the Management of Care for Women and Newborns During the Third Stage of Labor Among Japanese Hospitals, Clinics, and Midwifery Birth Centers. *International Journal of Childbirth*,5(4),200-209.

片岡弥恵子,櫻井綾香,江藤宏美,堀内成子.(2010).日本の医療施設における DV 被害者支援の現状.聖路加看護大学紀要,36,59-63.

Kavanagh,J.,Kelly,A.J.,&Thomas,J.(2005).Breast stimulation for cervical ripening and induction of labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2005, 3. doi: 10.1002/14651858.CD003392.pub2

川瀬昭彦,近藤 裕一.(2004).熊本県の産科施設における新生児のルーチンケア～アンケートの結果より～.日本周産期・新生児医学会雑誌,40(3),544-546.

近藤厚生,下須賀洋一,小口秀紀,柴田金光,倉内修,市古哲,... 後藤亨.(2008). 二分脊椎の発生
病態と予防および総合医療】 葉酸摂取は神経管閉鎖障害のリスクを低減する 認知率
とサプリメント摂取率は変化したか.小児の脳神経,33(1),13-20.

近藤厚生,大森ゆみ子,(2008). 助産師の妊婦指導 酸は神経管閉鎖障害を予防する. 助産
師,62(2),34-37

近藤美佳,森川重彦,下須賀洋一,近藤厚生.(2011). 神経管閉鎖障害の防止 婦の葉酸認知率と
葉酸サプリメント内服率、産婦人科外来からの情報発信.周産期医学,41(4),549-552.

公益社団法人 日本助産師会.(2014).助産業務ガイドライン 2014.

<http://www.midwife.or.jp/pdf/guideline/guideline.pdf>

公益社団法人日本助産師会 安全対策委員会・助産所部会.(2014). クリステル胎児圧出法(子
宮底圧迫法)の実態調査.助産師,68(3),92-96.

公益社団法人 日本看護協会.(2016).看護統計資料 (3)助産師(年次別・就業場所別).

<https://www.nurse.or.jp/home/statistics/pdf/toukei03-2016.pdf>

公益社団法人 日本看護協会.(2014).平成 24 年度「助産師の出向システムと助産実習の受け
入れ可能性等に関する調査」「助産師出向システムと助産師就業継続意思に関する調査」
報告書. <http://www.nurse.or.jp/nursing/josan/pdf/2012/h24chosahokoku-01.pdf>

公益社団法人 日本産科婦人科学会,公益社団法人 日本産婦人科医会.(2014).産婦人科診療
ガイドラインー産科編 2014. http://www.jsog.or.jp/activity/pdf/gl_sanka_2014.pdf

公益財団法人 日本医療機能評価機構.(2013).第 3 回産科医療補償制度 再発防止に関する
報告書～産科医療の質の向上に向けて～.

http://www.sanka-hp.jcqh.or.jp/pdf/Saihatsu_Report_03_All.pdf

公益財団法人 日本医療機能評価機構.(2014).第 4 回産科医療補償制度 再発防止に関する
報告書～産科医療の質の向上に向けて～.

http://www.sanka-hp.jcqh.or.jp/documents/prevention/report/pdf/Saihatsu_Report_04_All.pdf

公益財団法人 日本医療機能評価機構.(2015).産科医療補償制度 再発防止委員会からの提言集 第1回報告書～第5回報告書.

http://www.sanka-hp.jcqh.or.jp/documents/prevention/pdf/Saihatsu_Proporsal_01-05.pdf

公益財団法人 日本医療機能評価機構.(2016).再発防止委員会からの提言集、リーフレット・ポスター 産科関係者の皆様へ 出生後早期の新生児管理について.

http://www.sanka-hp.jcqh.or.jp/documents/prevention/proposition/pdf/Saihatsu_sinseizikanri_sankairyokankeisya.pdf

厚生労働科学研究 妊娠出産ガイドライン研究班(編).(2013).I 本ガイドラインについて.科学的根拠に基づく快適で安全な妊娠出産のためのガイドライン 2013年版(p.1).金原出版株式会社.

厚生労働省.(2009).周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会報告書.<http://www.jspnm.com/topics/data/topics090615-1.pdf>

厚生労働省.(2012).疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針.
<http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000018265.pdf>

厚生労働省.(2015).人工動態調査 市部一郡部・出生の場所別にみた年次別出生数.
<http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001157965>

厚生労働省.(2015).日本人の食事摂取基準(2015年版)報告書.
<http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000042638.pdf>

Lewis, J.S., Zuccolo, L., Davey, G.S., Macleod, J., Rodriguez, S., Draper, E.S., . . .

Gray, R. (2012). Fetal alcohol exposure and IQ at age 8: Evidence from a population-based birth-cohort study. *Public Library of Science ONE*, 7(11), 1-8.

Lundquist, M., Olsson, A., Nissen, E., & Norman, M. (2000). Is it necessary to suture all lacerations after a vaginal delivery?. *Birth*, 27(2), 79-85.

前田菜穂子, 片岡弥恵子, 江藤宏美, 堀内成子. (2013). 分娩後出血のリスク因子および予防的介入に関する文献レビュー. *日本助産学会誌*, 27(1), 4-15.

- 前田尚子,田口玲奈,北小路博司.(2014). 助産師からみたツボ療法に関するアンケート調査
(社)茨城県助産師会所属の助産師への調査より.社会鍼灸学研究,(8),37-48.
- 松島実穂,酒井啓治,岩下光利.(2015). 【妊婦さんへの説明にそのまま使える イラストでハ
イリスク妊娠がわかる本】 (1章)産科合併症 貧血, ペリネイタルケア,新春増刊,38-43.
- McDonald,S.J., Middleton,P., Dowswell,T.,& Morris,P.S.(2013). Effect of timing of
umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, 7. doi:
10.1002/14651858.CD004074.pub3
- Minds.(2014).Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2014 第1章診療ガイドライン総
論.<http://minds4.jcqh.or.jp/minds/guideline/handbook2014.html>
- Minds.(2012).診療ガイドラインとは.http://minds.jcqh.or.jp/n/st_1.php?page=4
- 文部科学省.(2015).日本食品標準成分表 2015 年度版(七訂) 第2章日本食品標準成分表 16
し好飲料類.
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/_icsFiles/afieldfile/2016/03/01/1365343_1-0216r3.pdf
- 宮本雅子,但馬まり子,赤井由紀子(2015). 病院勤務助産師のフリースタイル分娩の介助体験
の思いと推進への課題.日本看護学論文集:ヘルスプロモーション, 45, 7-10.
- Moore,E.R.,Bergman,N.,Anderson,G.C.,& Medley,N.(2016). Early skin-to-skin contact
for mothers and their healthy newborn infants. *Cochrane Database of Systematic
Reviews 2016*, 11. doi: 10.1002/14651858.CD003519.pub4
- Mori,R.,Khanna,R.,Pledge,D.,&Nakayama,T.(2010). Meta-analysis of physiological
effects of skin-to-skin contact for newborns and mothers. *Pediatrics
International*,52(2),161-170.
- 毛利多恵子,藤井ひろみ,嶋澤恭子,大石時子,市川香織.(2012).「助産所助産師による会陰裂傷
縫合に関する実態調査」報告.助産師,66(4),36-40.
- National health and medical research council.(2009).Australian Guidelines TO
REDUCE HEALTH RISK from Drinking Alcohol.
<https://www.nhmrc.gov.au/files/nhmrc/publications/attachments/ds10-alcohol.pdf>

- National Institute for Health and Care Excellence.(2008).Antenatal care routine care for the healthy pregnant woman.
<https://www.nice.org.uk/guidance/cg62/evidence/full-guideline-corrected-june-2008-196748317>
- National Institute for Health and Care Excellence .(2014).Intrapartum care : Care of healthy women and their babies during childbirth.
<https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/evidence/full-guideline-248734765>
- 日本周産期・新生児医学会.(2012).「早期母子接触」実施の留意点.
http://www.jspnm.com/sbsv13_8.pdf
- Pravikoff,D.S., Tanner,A.B., &Pierce,S,T.(2005). Readiness of U.S. Nurses for Evidence-Based Practice. *American Journal of Nursing*,105(9),40-51.
- Public Health Agency of Canada.(2014).Healthy Pregnancy Caffeine and Pregnancy.
<http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-gs/known-savoir/caffeine-eng.php>
- ロバート H.フレッチャー,スザンヌ W.フレッチャー,グラント S.フレッチャー
 (2014/2016).福井次矢(訳),臨床疫学 EBM 実践のための必須知識 第3版(pp.168).メディカル・サイエンス・インターナショナル.
- 坂口けさみ,芳賀亜紀子,徳武千足,湯本敦子,近藤里栄,大平雅美,... 島田三恵子.(2010).周産期と医療安全 新生児・薬の医療安全 全国産科施設へのアンケート結果に基づくSTS(Early skin to skin contact)の現状と課題.周産期学シンポジウム,(28), 35-39.
- 聖路加看護大学 女性を中心にしたケア研究班(編).(2004).第7章 推奨と解説.EBM の手法による周産期ドメスティック・バイオレンスの支援ガイドライン 2004 年版(pp.45-46).金原出版株式会社.
- 瀬戸知恵,田邊美智子,佐々木 綾子.(2009).産婦の QOL 向上を目指した分娩時の外陰部消毒に関する基礎的研究 わが国の外陰部消毒の実態とその関連因子.日本母性看護学会誌,9(1), 9-18.
- Smith,C.A.,Crowther,C.A.,&Grant,S.(2013). Acupuncture for induction of labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2013, 8. doi: 10.1002/14651858.CD002962.pub3

柴山知子,江藤宏美.(2015).分娩時に会陰部に温罨法を行うことによる会陰裂傷の低減の効果.日本助産学会誌,29(2),293-302.

清水かおり,片岡弥恵子,江藤宏美,浅井宏美,八重ゆかり,飯田真理子,... 田所由利子.(2013).エビデンスに基づく助産ケアガイドライン 病院、診療所、助産所における分娩第1期ケア方針の調査.日本助産学会誌,27(2),267-278.

進純郎.(2014). 助産よもやも話(第19回) 会陰保護は必要でしょうか?. 助産雑誌,68(10),918-921.

竹内翔子.(2014). 産褥早期の会陰部痛による日常生活への支障と病院・助産所におけるケア. 母性衛生,55(2),342-349.

竹内翔子,堀内成子.(2014). 何故妊婦は会陰マッサージをしないのか? 実態調査から探る. 日本助産学会誌,28(2),173-182.

瀧本秀美,米澤純子,島田真理恵,加藤則子,横山徹爾.(2013).日本助産師会会員における妊婦への食生活支援に関する調査「妊産婦のための食生活指針」活用状況を中心に.日本公衆衛生雑誌,60(1),37-46

照井克生.(2011).母体・胎児・新生児における鎮静・鎮痛・麻酔に関する全国アンケート調査結果. 周産期学シンポジウム,29,27-30.

The American Congress of Obstetricians and Gynecologists (2012).Optimizing Protocols in Obstetrics management of obstetric hemorrhage
2.<https://pdfs.semanticscholar.org/d891/06680a86dce4b6444d10073de55d74260023.pdf>

Weitzman,C., &Rojmahamongkol,P.(2015)Fetal alcohol spectrum disorder: Clinical features and diagnosis.
UpToDate.http://www.uptodate.com/contents/fetal-alcohol-spectrum-disorder-clinical-features-and-diagnosis?topicKey=PEDS%2F14381&elapsedTimeMs=4&source=search_result&searchTerm=alcohol+sundrom&selectedTitle=1%7E150&view=print&displayedView=full)

Wheeler,J., Davis,D., Fry,M., Brodie,P.,& Homer,C.S.E.(2011). Is Asian ethnicity an independent risk factor for severe perineal trauma in childbirth? A systematic review of the literature, *Women and Birth*,25(3),107-113.

World Health Organization.(1985). APPROPRIATE TECHNOLOGY FOR BIRTH. *The Lancet*,326(8452),436-437.

World Health Organization.(2012).WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage.http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75411/1/9789241548502_eng.pdf

World Health Organization Reigional Office for Europe Nutrition and Food Security.(2001). Healthy Eating during Pregnancy and Breastfeeding.http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0020/120296/E73182.pdf