

文献

先頭に*をつけた文献は、レビューに使用した文献を示す。

ABM Clinical Protocol #9: Use of galactogogues in initiating or augmenting the rate of maternal milk secretion (First Revision January 2011). (2011). *Breastfeed Med*, 6(1), 41-49. doi:10.1089/bfm.2011.9998

青野敏博. (1990). 乳汁分泌の内分泌性調節. *日本産科婦人科学会雑誌*, 42(8), 867-872.

Breastfeeding and the use of human milk. (2012). *Pediatrics*, 129(3), e827-841. doi:10.1542/peds.2011-3552

Chatterton, R. T., Jr., Hill, P. D., Aldag, J. C., Hodges, K. R., Belknap, S. M., & Zinaman, M. J. (2000). Relation of plasma oxytocin and prolactin concentrations to milk production in mothers of preterm infants: influence of stress. *J Clin Endocrinol Metab*, 85(10), 3661-3668. doi:10.1210/jcem.85.10.6912

*Di Pierro, F., Callegari, A., Carotenuto, D., & Tapia, M. M. (2008). Clinical efficacy, safety and tolerability of BIO-C(micronized silymarin) as a galactagogue. *Acta Biomed*.

*Gupta, M., & Shaw, B. (2011). A Double-Blind Randomized Clinical Trial for Evaluation of Galactagogue Activity of *Asparagus racemosus* Willd. *Iran J Pharm Res*, 10(1), 167-172.

Higgins, J., & Green, S. (2008). *cochrane handbook for systematic reviews of interventions*. England: wileyblackwell.

Hill, P. D., Chatterton, R. T., Jr., & Aldag, J. C. (1999). Serum prolactin in breastfeeding: state of the science. *Biol Res Nurs*, 1(1), 65-75.

厚生労働省(2007).授乳・離乳の支援ガイド.

http://rhino.med.yamanashi.ac.jp/sukoyaka/pdf/zyunyuu_all.pdf

厚生労働省(2015).乳幼児栄養調査結果の概要.

<http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000134207.pdf>

Kramer, M. S., & Kakuma, R. (2004). The optimal duration of exclusive breastfeeding: a systematic review. *Adv Exp Med Biol*, 554, 63-77.

正木朋也, & 津谷喜一郎. (2010). エビデンスに基づく医療 (EBM) の展開から学ぶもの:EBM 普及に伴い経験した課題と解決策. *日本評価研究*, 10(1), 1_3-1_16.

doi:10.11278/jjoes.10.1_3

水野克己, 水野紀子, & 瀬尾智子. (2012). よくわかる母乳育児 改訂第2版(pp.170-179): へるす出版.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *PLoS Med*, 6(7), e1000097. doi:10.1371/journal.pmed.1000097

中山健夫, 津谷喜一郎.(2008).臨床研究と疫学研究のための国際ルール集(p.156).ライフサイエンス出版

Nordeng, H., & Havnen, G. C. (2004). Use of herbal drugs in pregnancy: a survey among 400 Norwegian women. *Pharmacoepidemiol Drug Saf*, 13(6), 371-380. doi:10.1002/pds.945

*Rizal Damanik, D., Mark, L. W. A., & Wattanapenpaiboon, N. B. (2006). 12.Lactagogue effects of Torbangun, a Bataknese. *Asia Pac J Clin Nutr*.

佐竹元. (2001). 薬用ハーブを巡る国際的な動き(<特集>最近の天然物化学の進歩). *ファルマシア*, 37(7), 642-646.

*Sharma, S., Ramji, S., Kumari, S., & Bapna, J. S. (1996). Randomized controlled trial of *Asparagus racemosus* (Shatavari) as a lactagogue in lactational inadequacy. *Indian Pediatr*, 33(8), 675-677.

*Turkyilmaz, C., Onal, E., Hirfanoglu, I. M., Turan, O., Koc, E., Ergenekon, E., & Atalay, Y. (2011). The effect of galactagogue herbal tea on breast milk production and short-term catch-up of birth weight in the first week of life. *J Altern Complement Med*, 17(2), 139-142. doi:10.1089/acm.2010.0090

UNICEF/WHO BFHI2009 翻訳編集委員会(訳). (2009/2009). UNICEF/WHO 赤ちゃんとお母さんにやさしい母乳育児支援ガイドーベシック・コース「母乳育児成功のための10カ条」の実践(p.166). 医学書院.

WHO guidelines for governments and consumers regarding the use of alternative therapies. (2004). *Rev Panam Salud Publica*, 16(3), 218-221.