

引用・参考文献

- American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Practice Bulletins
Obstetrics. (2009). ACOG Practice Bulletin No.107. Induction of Labor. Obstetricians
and Gynecologists, 114, 2, Part1, 386-397.
- 秋山野恵, 有川裕子, 山崎有記(2013). 連日に及ぶ分娩誘発中の産婦の心情. 日本助産学会誌,
26(3), 146.
- 荒木勤(2010). 最新産科学 正常編. 第四版, 文光堂, 173-174, 230.
- 麻生珠理, 北川眞理子(2014). 誘発分娩の受け止め方や妊娠が出産体験をした女性の心理に与え
る影響. 日本助産学会誌, 27(3), 200.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change,
Psychological Review, 84(2),191-215.
- Boulvain, M. , Stan, C. M. & Irion, O. (2010). Membrane sweeping for induction of labour.
Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1. Art. No.: CD000451. DOI:
10.1002/14651858.CD000451.pub2.
- Chaudhry, Z. ,Fischer, J. & Schaffir, J.(2011). Women's use of nonprescribed methods to
induce labor: a brief report. Birth, 38(2), 168-171.
- Damania, K. K. , Natu, U. & Mhatre, P. N. et al. (1992). Evaluation of two methods employed
for cervical ripening. Journal of Postgraduate Medicine, 38(2), 58-59.
- Errol,R.N.,Charles,J.L.&Vanessa,A.B.Posttermpregnancy.UptoDate,http://www.uptodate.com/contents/posttermpregnancy?source=search_result&search=Postterm+pregnancy%5D&selectedTitle=1%7E28 [2014-07-15]
- グレッグ美鈴(2008). 質的研究のプロセス. 麻原きよみ, 横山美江. よくわかる質的研究の進め
方・まとめ方 看護研究のエキスパートをめざして. 54-72. 東京:医歯薬出版株式会社.
- Gülmezoglu, A.M.,Crowther,C.A. & Middleton, P.et al.(2012).Induction of labour for
improving birth outcomes for women at or beyond term.Cochrane Database of
Systematic Reviews,Issue6.ArtNo.:CD004945.DOI:10.1002/14651858.CD004945.pub3.
- Fahy, K. (2012). Editorial What is woman-centered care and why dose it matter? . Women
and Birth, 25, 149-151.
- Hills, M.& Mullet, J. (2002). Women-centred care: working collaboratively to develop gender

- inclusive health policy. *Health Care Women International*, 23(1), 84-97.
- 堀隆夫, 矢野直樹, 山名研二(2001). 過期妊娠境界領域の分娩に関する統計的検討. *洛和会病院医学雑誌*, 12, 32-40.
- 堀内成子(2013). 助産学講座 5 助産診断・技術学 1. 医学書院, 30-35.
- 飯田真理子(2010). “女性を中心としたケア-妊娠期尺度”の開発とその妥当性と信頼性の検討. *日本助産学会誌*, 24(2), 284-293.
- 石本泰子, 橋本貴志子, 小松原京子他(2004). 研究 調査 報告 褥婦から発信されたメッセージについて考える おしゃべりノートの効果と看護支援のあり方. *助産雑誌*, 58(1), 72-76.
- 岩田塔子(2006). 回旋がわかれば解除がわかる!体位別フリースタイル分娩介助法. *ペリネイタルケア*, 25(9), 81-90.
- Kavanagh, J. , Kelly, A. J. & Thomas, J. (2008). Sexual intercourse for cervical ripening and induction of labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Issue 2. Art. No.: CD003093. DOI: 10.1002/14651858.CD003093.
- Kelly, A. J. , Kavanagh, J. & Thomas, J. (2013). Castor oil, bath and/or enema for cervical priming and induction of labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Issue 7. Art. No.: CD003099. DOI: 10.1002/14651858.CD003099.pub2.
- 北原知奈, 北川真理子(2013). 分娩誘発中の心身の痛みに伴う産婦の情動と心の動き. *日本助産学会*, 26(3), 145.
- 近藤千恵, 谷神千賀, 中野純子他(2014). 有床助産所における妊婦健診の実態－助産所管理者への調査結果報告－. *助産師*, 68(2), 47-50.
- 厚生労働省. 平成 26 年度我が国の人口動態 平成 24 年までの動向. <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/81-1a2.pdf>, [2014-06-15]
- 眞鍋えみ子, 瀬戸正弘, 上里一郎(2004). 妊婦セルフケア行動動機づけ評定尺度短縮版の作成と信頼性・妥当性の検討. *Quality Nursing*, 10(9), 865-872.
- 毛利多恵子(2012). 助産所と病院における分娩体験の比較. *日本助産学会*, 8(2), 97-100.
- 村上明美(2000). 姿勢が骨産道の応形機能に及ぼす影響. *日本助産学会誌*, 13(2), 35-42.
- 内藤博之, 須藤なほみ, 占部智他(2004). 予定日超過妊娠の管理法に関する検討. *産婦の実際*, 53(8), 1197-1205.
- National Institute for Health and Clinical Excellence. (2008). Induction of labour. NICE ClinicalGuidelines70.InductionofLabour.<http://www.nice.org.uk/guidance/cg70/resource>

s/guidance-induction-of-labour-pdf. [2014-07-01]

日本産婦人科学会周産期委員会(2013). 周産期委員会報告. 日本産婦人科学会雑誌, 65(6).

日本産科婦人科学会(2013). 産科婦人科用語集・用語解説集 改定第3版. 金原出版.

新野由子, 市川香織, 鈴木京子(2011). 出産施設におけるサービス提供のあり方に関する研究. 母性衛生, 52(1), 168-175.

岡井崇, 綾部琢哉(2011). 標準産科婦人科学 第四版. 医学書院. 451-452, 456.

Sandall, J., S, H. & Gates, S. et al. (2013). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue8. Art. No.: CD004667. DOI: 10.1002/14651858.CD004667.pub3.

Schaffir, J. (2002). Survey of folk beliefs about induction of labor. Birth, 29(1), 47-51.

The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada Clinical Practice Guideline. (2008). Guidelines for the management of pregnancy at 41+0 to 42+0 weeks. <http://sogc.org/wp-content/uploads/2013/01/gui214CPG0809.pdf>. [2014-07-01]

社団法人日本産科婦人科学会(2014). 産婦人科診療ガイドライン産科編 2014. 237-244.

社団法人日本助産学会(2012). エビデンスに基づく助産ガイドライン—分娩期 2012. http://square.umin.ac.jp/~jam/docs/ebm_guideline_childbirth2012.pdf. [2014-07-01]

社団法人日本助産師会(2014). 助産業務ガイドライン 2014 年度改訂版. <http://www.midwife.or.jp/pdf/guideline/guideline.pdf>. [2014-07-01]

清水かおり, 片岡弥恵子, 江藤宏美他(2013). エビデンスに基づく助産ケアガイドライン; 病院, 診療所, 助産所における分娩第一期ケア方針の調査. 日本助産学会誌, 27(2), 267-278.

進純郎(2014). 分娩介助学 第二版. 医学書院. 148.

Smith, C. A. & Crowther, C. A. (2013). Acupunctyre for induction of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue8. Art. No. :CD002962. DOI:10.1002/14651858.CD002962.pub3.

Smith, H., Mahomed, K. & Xu, Q. et al. (1999). Getting research into practice: women-centered obstetric care. Cochrane Methodology Register. Issue3.

鈴木敬子, 大町寛子, 水谷幸子他(2003). 女性が出産に望むこと・助産院での調査より-. 母性衛生, 44(1), 98-104.

鈴井江三子, 平岡敦子, 蔵元美代子他(2005). 日本における妊婦健診の実態調査. 母性衛生, 46(1), 154-162.

高畑香織(2013). 分娩前 7 日間に妊婦が行った陣痛発来への取り組み. 2013 年度聖路加看護大学
大学院看護研究科修士論文

田中啓, 村越毅, 神農隆他(2011). 妊娠 41 週予定日超過症例に対する誘発分娩の検討. 日本周産
期・新生児医学会雑誌, 47(1), 97-102.

土屋清志(2010). 産科医と助産師の連携はどこまでできる 6. 個人施設における連携②個人産
科施設と助産院との連携. 産科と婦人科, 77(10), 82-88.

Ugwu, E.O. , Obi, S. N. & Ifeikigwe, E.S. et al. (2014). Membrane stripping to prevent post-
term pregnancy in Enugu, Nigeria: a randomized controlled trial. Niger J Med. 2014 Jul-
Sep;23(3):248-53.

山口さつき, 平山恵美子(2011). 出産体験の自己評価に影響を及ぼす要因. 母性衛生, 52(1), 160-
167.

Wagner, M. (1994). WHO 勧告にみる望ましい周産期ケアとその根拠. 井上裕美, 河合蘭 監訳
(2002).メディカ出版.162.