

## 参考文献

- Alarab M, Regan C, O'Connell MP et al. (2004) .  
Singleton vaginal breech delivery at term: still a safe option.  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=singleton%20-vaginal%20breech%20delivery%20at%20term%20%20Alarab>[2011.6.23]
- ACOG HP. <http://www.acog.org/> [2011.6.23]
- ACOG (2001) . ACOG committee opinion. Mode of term singleton breech delivery. Number 265, December 2001. American College of Obstetricians and Gynecologists.  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12053896>[2011.6.23]
- ACOG (2006) . ACOG Committee Opinion No. 340. Mode of term singleton breech delivery. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16816088>[2011.6.23]
- Carolyn F, Weiniger, Yehuda Ginosar et al. (2007) .External cephalic version for breech presentation with or without spinal analgesia in nulliparous women at term. *Obstetrics & Gynecology*, 10, 1343- 1350.
- Collaris,PC Tan (2008) . Oral nifedipine versus subcutaneous terbutaline tocolysis for external cephalic version: A double-blind randomized trial. *General Obstetrics* 20. 74-81.
- Coyle ME, Smith CA, Peat B (2008) . Cephalic version by moxibustion for breech presentation. DOI: 10.1002/14651858.CD003928.pub2  
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003928.pub2/abstract> [2011.10.7]
- EKHutton, ME Hannah, SJ Ross et al. (2011) . The Ealy External Cephalic Version (ECV) 2trial:an international milticentre radomised controlled trial of timing of ECV for breech pregnancies. *International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 118 (5) , 564-577
- 江守陽子, 茅島江子, 前原澄子他 (1995) . 分娩体験の評価に関する分析—当事者の認知的評価からの分析—. 母性衛生, 36. 470- 477.
- 福井次夫 (2003) . EBM と診療ガイドライン. からだの科学増刊. 2-6
- 藤井知行 (2010) . 骨盤位分娩の分娩方針. 周産期医学 40 (增刊号) , 324-327.
- Goffinet F, Carayol M, Foidart JM et al. (2006) . Is planned vaginal delivery for breech presentation at term still an option? Results of an observational prospective survey in France and Belgium  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16580289>[2011.6.23]
- Hannah ME, Hannah WJ&Henson SA, et al. (2000) . Planed cesarean section versus planed vaginal birth for breech presentation at term: a randomized multicentre

- trial. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11052579>. [2011.6.23]
- 林田和郎 (1987). 東洋医学の方法による胎位矯正方法. 東邦医会誌 34. 196-206
- Higgins,J, Green, S (Eds) . (2009) . Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions5.0.1.Hoboken NJ: John Wiley& Sons.
- Horfmer GJ, Gyte GML (2004) . Interventions to help external cephalic version for breech presentation at term. DOI: 10.1002/14651858.CD000184.pub3  
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000184.pub3/abstract>  
[2011.10.7]
- Horfmer GJ, Kulier R (2000) . Cephalic version by postural management for breech Presentation. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000051/pdf>  
[2011.10.7]
- Horfmer GJ, Kulier R (1996) .External cephalic version for breech presentation at term. DOI: 10.1002/14651858.CD000051.  
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000083/abstract>.  
[2011.10.7]
- Hutton EK, Horfmer GJ (2010) . External cephalic version for breech presentation before term. DOI: 10.1002/14651858.CD000084.pub2  
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000084.pub2/abstract>.  
[2011.1.7]
- 市川きみえ, 鎌田次郎 (2009) . 豊かな出産体験をもたらす助産とは—出産体験尺度による調査—. 母性衛生 50, 79-87.
- 印出佑介, 中井章人 (2009) . 我が国における帝王切開分娩の最近の動向. 周産期医学, 40, 1441-1447.
- IOM. <http://www.iom.edu/>[2011.6.22]
- Jennifer Hilton, Bruce Allan, Chery Swady et al. Intervenous Nitroglycerin for External Cephalic Version. Obstetricians and Gynecologists. 3, 560- 567.
- Jorge Vas, Jose Manuel Aranda, Betina Nishishinya et al (2009) . Correction of nonvertex presentation with moxibustion : a systematic review and metaanalysis. American Journal of Obstetrics& Gynecology 201, 241- 259
- 小林正幸, 石本泰子, 盆子原幸子他 (2010) . 骨盤位に対する温灸の効果. 島根母性衛生学会雑誌,14, 43-46.
- 厚生労働省. 2-11 医療機関における分娩件数と帝王切開娩出術割合の年次推移.  
<http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hoken/national/22.html>. [2011.06.18]
- Guitar,Michelle Pichon&Hongguang Dong et al. (2009) . Moxibustion for Breech Version. Obstetricians and Gynecologists, 114, 1034- 1040.
- Guitar,Michelle Pichon&Hongguang Dong et al. (2009) . Side- Effects of Moxibustion

- for Cephalic Version of Breech Presentation.  
Alternative and Complementary Medicine, 14, .1231-1233.
- Marjolein Kok, Joke M Bais, Jan M Lith et al. Nifedipine as a Uterine Relaxant for External Cephalic Version. Obstetricians and Gynecologists.112, 271-276.
- 松浦眞彦, 山本樹生 (2005) . 骨盤位の成因と頻度. 産科と婦人科 72 (4) . 413-417
- 丸茂元三, 森田豊, 内田紗知他 (2010) . 骨盤位に対する胸膝位指導の有用性. 産婦人科治療 100, 99-103.
- 森臨太郎 (2010) . 日本におけるガイドラインについて—その現状—. 周産期医, 40. 433- 437.
- Nor Azlin, Maryasalwati Ibrahim, Norzikawati M Naim et al. Nifedipine versus terbutaline for tocolysis in external cephalic version. International Journal of Gynecology and Obstetrics 102, 263-266.
- 中山健夫 (2004) . EBM を用いた診療ガイドライン作成・活用ガイド. 金原出版, 11-22.
- 中山健夫 (2005) . EBM の手法を用いた診療ガイドライン: 日本における取り組み・課題と展望. 日本補完代替医療学会誌 2 (2) . 113- 125.
- 南郷栄秀 (2011) . はじめてレビューーシート 3.5. [http://spell.umin.jp/BTS\\_SR4.0.pdf](http://spell.umin.jp/BTS_SR4.0.pdf) [2011.6.22]
- NICE (2008) . Antenatal care routine care for the healthy pregnant woman. 280- 281. <http://publications.nice.org.uk/antenatal-care-cg62>
- 日本看護協会 HP <http://www.nurse.or.jp/home/innaijyosan/index.html>[2011.6.22]
- 日本産科婦人科学会 (2011) . 402 骨盤位の取り扱いは? 産婦人科診療ガイドライン- 産科編 2011. 166- 169.
- 日本産科婦人科学会編 (2008) . 産科婦人科用語集・用語解説集 改定第 2 版. 金原出版
- 日本助産師会. 助産師の声明, <http://www.midwife.or.jp/index.html>[2011.06.22]
- 新村出 編 (2008) . 広辞苑第 6 版. 岩波書店, 468.
- O'Connor , Jacobsen.Stacey. (2011) . Ottawa Personal Decision Guide. <http://decisionaid.ohri.ca/docs/das/OPDG.pdf>[2012.1.24]
- Sullivan, W. A. Grobmann, J. R. Bauchat (2009) . A randomized controlled trial of the effect of combined spinal-epidural analgesia on the success of external cephalic version for breech presentation. International Journal of Obstetric Anesthesia 18, 328-334.
- 竹原健二,野口真貴子,嶋根卓也他 (2009) . 出産体験の決定因子—出産体験を高める要因は何か—. 母性衛生 50 (2) . 360-371.
- 常盤洋子 (2001) . 出産体験の自己評価に影響を及ぼす要因の検討 初産婦と経産婦の違い. 群馬保健学紀要 22. 22- 39.
- 辻内敬子 (2009) . 女性疾患に対する鍼灸治療 骨盤位に対する鍼灸治療.

現代鍼灸学 9 (1) . 65-70.

吉川裕之 (2010) . 診療ガイドラインの読み取りで注意すべき点. 周産期医学 40 (4) . 439-442.

吉田昌史, 松田秀雄, 川上裕一, (2010) . 硬膜外麻酔併用児頭外回転術の有用性. 日本周産期新生児医学会雑誌 46 (1) . 27-31.

日本助産師会 (2009) . 助産所業務ガイドライン 2009 改訂版. 日本助産師会出版,20.

Wilcox. N Nassar, CL Roberts (2010) .Effectiveness of nifedipine tocolysis to facilitate external cephalic version: a systematic review.An International Jounal of Obstetrics and Gynaecology118 (4) 423-428.