

引用文献

- Boonstra, G., Burger, H., Grobbee, D. E., & Kahn, R. S. (2011). Antipsychotic prophylaxis is needed after remission from a first psychotic episode in schizophrenia patients: Results from an aborted randomised trial. *International Journal of Psychiatry in Clinical Practice*, 15(2), 128-134. doi:10.3109/13651501.2010.534801 [doi]
- Chen, E. Y., Hui, C. L., Lam, M. M., Chiu, C. P., Law, C. W., Chung, D. W., . . . Honer, W. G. (2010). Maintenance treatment with quetiapine versus discontinuation after one year of treatment in patients with remitted first episode psychosis: Randomised controlled trial. *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 341, c4024. doi:10.1136/bmj.c4024 [doi]
- Crow, T. J., MacMillan, J. F., Johnson, A. L., & Johnstone, E. C. (1986). II. A randomised controlled trial of prophylactic neuroleptic treatment. *British Journal of Psychiatry*, 148(2), 120-127. doi:10.1192/bjp.148.2.120
- Dixon, L. B., Holoshitz, Y., & Nossel, I. (2016). Treatment engagement of individuals experiencing mental illness: Review and update. *World Psychiatry*, 15(1), 13-20. doi:10.1002/wps.20306
- 益,加代子,林,千冬,村上,明美,伊藤,聡子,松村,佳苗,内田,雅子,奥村,朋子,藤田,京子, 山本,和代 & 岸本,愛子.(2012).Work Engagement と ICU 看護師の特徴、ICU 職場特性との関連. *日本看護学会論文集:看護管理*, (42),200-203. <http://search.jamas.or.jp/link/ui/2012221604>
- 榎戸, 文子. (2020). A 精神科クリニックの通院を中断している統合失調症患者に関する調査
通院中断に至る過程に焦点を当てて. *日本看護科学学会学術集会講演集*, 40 回, 11.
<http://search.jamas.or.jp/link/ui/V526410126>
- 榎本, 哲郎, & 柳澤, 雄太. (2017). 【統合失調症の治療ガイドライン】統合失調症薬物治療ガイドライン「治療抵抗性統合失調症への対応」の特徴と実践的使用法. *臨床精神薬理*, 20(12), 1461-1467.
- Ford, R., Barnes, A., Davies, R., Chalmers, C., Hardy, P., & Muijen, M. (2001). Maintaining contact with people with severe mental illness: 5-year follow-up of assertive outreach. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 36(9), 444-447. doi:10.1007/s001270170022 [doi]
- Froh, J. J., Parks, A. C., 島井, 哲志, 福田, 早苗, & 亀島, 信也. (2017). ポジティブ心理学を
味わう : エンゲイジメントを高める 25 のアクティビティ. 京都: 北大路書房.
- Gaebel, W., Riesbeck, M., Wolwer, W., Klimke, A., Eickhoff, M., von Wilmsdorff, M., German Study Group on First-Episode Schizophrenia. (2011). Relapse prevention in first-episode schizophrenia--maintenance vs intermittent drug treatment with prodrome-based early intervention: Results of a randomized controlled trial within the german research network on schizophrenia. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 72(2), 205-218. doi:10.4088/JCP.09m05459yel [doi]
- Gitlin, M., Nuechterlein, K., Subotnik, K. L., Ventura, J., Mintz, J., Fogelson, D. L., . . . Aravagiri, M. (2001). Clinical outcome following neuroleptic discontinuation in patients with remitted

- recent-onset schizophrenia. *The American Journal of Psychiatry*, 158(11), 1835-1842.
doi:10.1176/appi.ajp.158.11.1835 [doi]
- 長谷川, 浩, 石垣, 靖子, 川野, 雅資, 村本, 淳子, & 高橋, 真理. (1993). *共感的看護：いま、ここでの出会いと気づき*. 医学書院.
- 堀, 輝. (2017). 【統合失調症の治療ガイドライン】海外のガイドラインから見た統合失調症薬物療法 再発・再燃時の記載を中心に. *臨床精神薬理*, 20(12), 1425-1432.
- 伊賀, 淳一. (2017). 【統合失調症の治療ガイドライン】統合失調症薬物治療ガイドライン「再燃再発への対応」の特徴と実践的使用法. *臨床精神薬理*, 20(12), 1449-1453.
- 稲田, 健. (2017). 【統合失調症の治療ガイドライン】日本神経精神薬理学会の統合失調症薬物治療ガイドラインとその位置づけ. *臨床精神薬理*, 20(12), 1433-1439.
- 岩谷, 潤, & 伊藤, 順一郎. (2017). 【精神科領域におけるアウトリーチ支援の現在】精神科領域におけるアウトリーチ(支援)の現在と未来. *臨床精神医学*, 46(2), 121-126.
- 金沢, 徹文, 竹内, 啓善, 菱本, 明豊, 伊藤, 侯輝, & 岸本, 泰. (2017). 【統合失調症の治療ガイドライン】統合失調症薬物治療ガイドライン「維持期の統合失調症治療」の特徴と実践的使用法. *臨床精神薬理*, 20(12), 1455-1460.
- 神田, 正樹. (2018). 顧客エンゲージメントの範囲・次元・構成概念の解明 -取引を超えたエンゲージメントの精緻化. *商学研究論集*, 48, 127-146. Retrieved from https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=jairo_____:4736c83ff0c8dae27ea0e9705cf80fcc
- Kane, J. M., Rifkin, A., Quitkin, F., Nayak, D., & Ramos-Lorenzi, J. (1982). Fluphenazine vs placebo in patients with remitted, acute first-episode schizophrenia. *Archives of General Psychiatry*, 39(1), 70-73. doi:10.1001/archpsyc.1982.04290010048009 [doi]
- Kaplan, H. I., 1927, Sadock, B. J., 1933, Sadock, V. A., 井上, 令一, & 四宮, 滋子. (2004). *カプラン臨床精神医学テキスト：DSM-IV-TR 診断基準の臨床への展開 / ベンジャミン J. サドック, バージニア A. サドック編；井上令一, 四宮滋子監訳 (第2版 ed.). メディカル・サイエンス・インターナショナル.*
- 川内, 恵 & 大橋, 一友. (2011). 二次医療圏の国公立病院で働く助産師・看護師の Work Engagement 及び職務満足度と離職意思の関係. *日本看護管理学会誌*, 15(1), 39-46.
<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2011353700>
- Kayama, M., Kido, Y., Setoya, N., Tsunoda, A., Matsunaga, A., Kikkawa, T., . . . Ito, J. (2014). Community outreach for patients who have difficulties in maintaining contact with mental health services: Longitudinal retrospective study of the Japanese outreach model project. *BMC Psychiatry*, 14, 311-y. doi:10.1186/s12888-014-0311-y [doi]
- 菊本, 弘次. (2004). 【地域で実践できる危機予防と危機介入】治療関係の危機 通院しなくなるとき 精神科治療を途切れさせないために. *精神科臨床サービス*, 4(4), 520-523.

- 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計画研究部. (2017). 精神保健福祉資料. Retrieved from <https://www.ncnp.go.jp/nimh/seisaku/data/>
- 小松, 康宏, 門田, 美和子, & 福井, 次矢. (2016). 【診療を支える枠組み: 最近の動き】医療の質改善の概念と手法 PDCA、six sigma など. *日本内科学会雑誌*, 105(12), 2353-2357.
- 厚生労働省精神保健福祉対策本部. (2004). 精神保健医療福祉の改革ビジョン. Retrieved from <https://www.mhlw.go.jp/topics/2004/09/tp0902-1.html>
- 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課. (2017). これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書. Retrieved from <https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000152029.html>
- 窪田, 彰. (2016). 多機能型精神科診療所による地域づくり : チームアプローチによる包括的ケアシステム 金剛出版. Retrieved from <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB21122073>
- 黒田, 直明, 林, 志光, 森田, 展彰, 木代, 眞樹, 柏瀬, 宏隆, & 中谷, 陽二. (2007). 外来通院中の統合失調症患者の服薬観に関連する要因について dai-30 による検討. *臨床精神医学*, 36(8), 995-1003.
- Leucht, S., Tardy, M., Komossa, K., Heres, S., Kissling, W., Salanti, G., & Davis, J. M. (2012). Antipsychotic drugs versus placebo for relapse prevention in schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. *Lancet (London, England)*, 379(9831), 2063-2071. doi:10.1016/S0140-6736(12)60239-6 [doi]
- MacKay, R. C., Hughes, J. R., Carver, E. J., 川野, 雅資, 長田, 久, & 河合, 美子. (1991). 共感的理解と看護 / R.C. マッケイ, J.R. ヒューズ, E.J. カーバー編 ; 川野雅資, 長田久雄監訳. 医学書院.
- 松本, 千明. (2016). やる気を引き出す保健指導・患者指導 健康行動理論に基づいて. *日本保健医療行動科学会雑誌*, 31(2), 40-45.
- 松本, 千明, & 山本, 和利. (2001). 【EBm の観点からみた糖尿病】2 型糖尿病患者の教育. *Diabetes Frontier*, 12(2), 239-243.
- Maxwell, J., & 鈴木, 純一. (1977). 治療共同体を超えて : 社会精神医学の臨床 / マックス ウェル・ジョーンズ著 ; 鈴木純一訳. 岩崎学術出版社.
- 三ヶ木, 聡子, 東, 健太郎, 榎戸, 文子, 下村, 裕美子, & 窪田, 彰. (2016). 精神科診療所におけるアセスメントパス(錦糸町モデル)の作成. *日本外来精神医療学会プログラム・抄録集*, 16 回, 100.
- Mitchell, A. J., & Selmes., T. (2007). Why don't patients attend their appointments? maintaining engagement with psychiatric services. *Advances in Psychiatric Treatment*, 13, 423-434. Retrieved from <https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-treatment/article/why-dont-patients-attend-their-appointments-maintaining-engagement-with-psychiatric-services/5E3E809B3FC76807765328FC1F05CB7D/core-reader>
- 三宅, 誕実, 松田, 勇紀, & 岸, 太郎. (2017). 【統合失調症の治療ガイドライン】統合失調症薬

- 物治療ガイドライン「初発精神病性障害への対応」の特徴と実践的使用法. 臨床精神薬理, 20(12), 1441-1447.
- 宮本, 千恵美.(2019).都市部大学病院の急性期病棟における退院支援の質改善. 聖路加国際大学大学院博士論文.
- 森嶋, 道子, 林, 有学 & 上平, 悦子.(2019).役職を持たない看護師の Work Engagement. 畿央大学紀要, 16(2), 35-42. <http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020195683>
- Moritz, S., Favrod, J., Andreou, C., Morrison, A. P., Bohn, F., Veckenstedt, R., . . . Karow, A. (2013). Beyond the usual suspects: Positive attitudes towards positive symptoms is associated with medication noncompliance in psychosis. *Schizophrenia Bulletin*, 39(4), 917-922. doi:10.1093/schbul/sbs005
- 中尾, 重嗣, & 中川, 敦夫. (2017). 【統合失調症の治療ガイドライン】統合失調症治療ガイドライン ガイドライン作成法の変遷を中心に. 臨床精神薬理, 20(12), 1417-1424.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2014). Psychosis and schizophrenia in adults: Prevention and management clinical guideline [CG178] . Retrieved from <https://www.nice.org.uk/guidance/cg178>
- 日本精神科看護技術協会.(2011).詳細精神科看護ガイドライン/日本精神科看護技術協会監修.精神看護出版.
- 日本神経精神薬理学会. (2018). 『統合失調症薬物治療ガイドー患者さん・ご家族・支援者のためにー』. じほう.
- Olivares, J. M., Sermon, J., Hemels, M., & Schreiner, A. (2013). Definitions and drivers of relapse in patients with schizophrenia: A systematic literature review. *Annals of General Psychiatry*, 12(1), 32. doi:10.1186/1744-859x-12-32
- Pérez-Fuentes, M. D. C., Molero Jurado, M. D. M., Gázquez Linares, J. J., & Oropesa Ruiz, N. F. (2018). The Role of Emotional Intelligence in Engagement in Nurses. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(9), 1915. doi: 10.3390/ijerph15091915. 10.3390/ijerph15091915 [doi]
- Rosenstock, I. M. (1988). Social learning theory and the health belief model. *Health Education Quarterly*, 15, 173-183. doi:10.1177/109019818801500203
- Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. *Journal of Happiness Studies*, 3(1), 71-92. doi:10.1023/A:1015630930326
- Sfetcu, R., Musat, S., Haaramo, P., Ciutan, M., Scintee, G., Vladescu, C., . . . Katschnig, H. (2017). Overview of post-discharge predictors for psychiatric re-hospitalisations: A systematic review of the literature. *BMC Psychiatry*, 17(1), 227-z. doi:10.1186/s12888-017-1386-z [doi]
- 島津, 明人. (2010). 【職業性ストレスにかかわる最新情報】職業性ストレスとワーク・エンゲイジメント. ストレス科学研究, 25, 1-6. <http://search.jamas.or.jp/link/ui/2010303995>

- Shimazu, A., Schaufeli, W., Kosugi, S., Suzuki, A., Nashiwa, H., Kato, A., . . . Kitaoka-Higashiguchi, K. (2008). Work engagement in japan: Validation of the japanese version of the utrecht work engagement scale. *Applied Psychology*, 57, 510-523. doi:10.1111/j.1464-0597.2008.00333.x
- Sparr, L. F., Moffitt, M. C., & Ward, M. F. (1993). Missed psychiatric appointments: Who returns and who stays away. *The American Journal of Psychiatry*, 150(5), 801-805. doi:10.1176/ajp.150.5.801 [doi]
- Swindell, J. S., McGuire, A. L., & Halpern, S. D. (2010). Beneficent persuasion: Techniques and ethical guidelines to improve patients' decisions. *Annals of Family Medicine*, 8(3), 260-264. doi:10.1370/afm.1118 [doi]
- 新海, 朋子, & 住友, 雄資. (2018). 精神障害をもつ人のリカバリー概念に関する文献検討. 福岡県立大学人間社会学部紀要, 26(2), 71-85. Retrieved from <https://www.openaire.eu/search/publication?articleId=jairo::1d68fe0c79714a86a512b3859ca61b09>
- 武井, 麻子, & 鈴木, 純一. (1998). レトリートとしての精神病院 / 武井麻子, 鈴木純一編集. ゆみる出版.
- 谷井, 幸子, & 蓑田, 栄子. (2010). 外来通院中断をくり返す患者へのアプローチ 生活維持が困難な親子への介入. 日本精神科看護学会誌, 53(3), 24-26.
- Thoegersen, M. H., Morthorst, B. R., & Nordentoft, M. (2019). Assertive community treatment versus standard treatment for severely mentally ill patients in denmark: A quasi-experimental trial. *Nordic Journal of Psychiatry*, 73(2), 149-158. doi:10.1080/08039488.2019.1576765
- Weiden, P. J., Kim, E., Bermak, J., Turkoz, I., Gopal, S., & Berwaerts, J. (2017). Does half-life matter after antipsychotic discontinuation? A relapse comparison in schizophrenia with 3 different formulations of paliperidone. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 78(7), e813-e820. doi:10.4088/JCP.16m11308 [doi]
- West, M., 下山, 晴彦, & 高橋, 美保. (2014). チームワークの心理学 : エビデンスに基づいた実践へのヒント / マイケル・A・ウェスト著 ; 高橋美保訳. 東京大学出版会.
- Williams, C., Firn, M., Wharne, S., MacPherson, R., & Mueser, K. T. (2010). *Assertive outreach in mental healthcare*. Hoboken: WILEY. Retrieved from <http://portal.igpublish.com/iglibrary/search/WILEYB0009316.html>
- Wright, N., Callaghan, P., & Bartlett, P. (2011). Mental health service users' and practitioners' experiences of engagement in assertive outreach: A qualitative study. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 18(9), 822-832. doi:10.1111/j.1365-2850.2011.01733.x
- Wunderink, L., Nienhuis, F. J., Sytma, S., Slooff, C. J., Knegtering, R., & Wiersma, D. (2007). Guided discontinuation versus maintenance treatment in remitted first-episode psychosis: Relapse rates and functional outcome. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 68(5), 654-661.

doi:10.4088/jcp.v68n0502 [doi]

- 山田, 浩樹, 稲田, 健, 佐藤, 創一郎, 辻野, 尚久, & 渡邊, 博幸. (2017). 【統合失調症の治療ガイドライン】統合失調症薬物治療ガイドライン「その他の臨床的諸問題」の特徴と実践的使用法. 臨床精神薬理, 20(12), 1469-1475.
- 山口, 哲顕, 桑原, 寛, & 横井, 晋. (1985). 横浜市立大学医学部病院神経科における精神分裂病患者の通院状況. 神奈川県精神医学会誌, (35), 73-79.
- 山元, 恵. (2015). 服薬中断の経験がある統合失調症患者への退院支援 コンコーダンス・スキルを実践して. 日本精神科看護学術集会誌, 58(1), 314-315.
- 山本, 智. (2018). インプット、アウトプット、アウトカムのコミュニケーション ステップから組み立てた効果測定手法「emf モデル」の検討, 日本広報学会. 広報研究, 22, 135-144.